



予防接種スケジュール（0歳から思春期まで）



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期/思春期											
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上				
インフルエンザ菌b型（ヒブ）	不活化			①	②	③						④															
肺炎球菌（PCV13）	不活化			①	②	③						④															
B型肝炎	不活化			①	②						③																
ロタウイルス （口から飲むワクチン）	ロタリックス 生	1回目は14週6日までに接種		①	②	(注1)																					
	ロタテック	1回目は12週6日までに接種		①	②	③			(注2)																		
4種混合（DPT-IPV）	不活化			①	②	③						④	(注3)		(7.5歳まで)							11歳～2種混合接種 （ジフテリア・破傷風）	①	12歳			
BCG	生																										
麻疹・風疹混合（MR）	生												①										②	(注4)			
水痘	生												①		②												
おたふくかぜ （任意接種）	生												①											②	(注5)		
日本脳炎	不活化														①	②	③	(7.5歳まで)				④	9-12歳				
インフルエンザ （任意接種）	不活化																							①	毎年（10、11月などに）①② 生後6か月以上12歳まで（13歳未満）2回接種	①	13歳以上は1回接種
ヒトパピローマウイルス （HPV）	不活化																							小6	中1 ①②③	中2～ 高1	(注6)

定期接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書に記載はされていないが小児科学会接種を推奨する時期



接種等の問い合わせは健康づくり課(0162-23-4000)へ



注意事項の説明

- (注1) 計2回、②は、生後24週までに完了すること
- (注2) 計3回、③は、生後32週までに完了すること
- (注3) ③-④は6か月以上あけ、標準的には ③終了後12-18か月の間に接種
- (注4) 小学校入学前の1年間
- (注5) 予防効果を確実にするために、2回接種が必要である①は1歳を過ぎたら早期に接種、②はMRと同時期（5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間）での接種を推奨する
- (注6) 積極的勧奨差し控えの期間に接種できなかった平成9-17年度（1997-2005年度）生まれの女性に対して、令和4-6年度（2022-2024 年度）の3年間に限り、キャッチアップ接種が可能である。

参考：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール